

HTKK, TTKK, LTKK, OY, ÅA/Insinööriosastot  
 Valintakuulustelujen matematiikan koe 28.5.1997  
 Ratkaisut

1. Merkitään  $\bar{a} = \bar{a}_1 + \bar{a}_2$ , missä  $\bar{a}_1$  on vektorin  $\bar{b}$  suuntainen ja  $\bar{a}_2$  vektoria  $\bar{b}$  vastaan kohtisuorassa. On olemassa luku  $t \in \mathbb{R}$  siten, että  $\bar{a}_1 = t\bar{b}$ . Tällöin  $\bar{a}_2 = \bar{a} - t\bar{b}$ . Kohtisuuruuden perusteella on

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = (\bar{a} - t\bar{b}) \cdot \bar{b} = 0,$$

mistä

$$t = \frac{\bar{a} \cdot \bar{b}}{\bar{b} \cdot \bar{b}}.$$

Koska  $\bar{a} \cdot \bar{b} = 24$  ja  $\bar{b} \cdot \bar{b} = 6$ , on  $t = 4$ . Tällöin kysytyt komponentit ovat  $\bar{a}_1 = 4(i - \bar{j} + 2k)$  ja  $\bar{a}_2 = 2(-i + 3\bar{j} + 2k)$

2. Olkoon  $D = (x, y)$ ,  $\sphericalangle DAB = \alpha$  ja  $\sphericalangle DBA = \beta$ . Tällöin

$$\begin{cases} \tan \alpha = \frac{y}{x} \\ \tan \beta = \frac{y}{3000-x} \end{cases}$$

Ratkaisemalla  $x$  ja  $y$  saadaan

$$\begin{cases} x = \frac{3000 \tan \beta}{\tan \alpha + \tan \beta} \\ y = x \tan \alpha \end{cases}$$

Koska  $\alpha = 32,8^\circ$  ja  $\beta = 64,1^\circ$ , on  $D = (2280, 1470)$ . Jos merkitään  $\sphericalangle DAE = \phi$ , räjähdysspatsaan korkeudelle  $h$  pätee, että

$$\tan \phi = h / \sqrt{x^2 + y^2},$$

missä  $x$  ja  $y$  ovat pisteen  $D$  koordinaatit. Tällöin  $h = \sqrt{x^2 + y^2} \tan \phi$ . Koska  $\phi = 3,5^\circ$  ja  $D = (2280, 1470)$ , on  $h = 170m$ .

3. Erotusfunktion

$$u(R) = u_1(R) - u_2(R) = \frac{ER}{R-81} - \frac{ER}{R-2025} \quad (R \geq 0)$$

derivaatta on

$$u'(R) = \frac{81E}{(R+81)^2} - \frac{2025E}{(R+2025)^2}.$$

Yhtälön  $u'(R) = 0$  ratkaisu antaa paikalliseksi ääriarvokohdaksi ehdolle vastuksen arvon  $R = \sqrt{81 \cdot 2025} = 9 \cdot 45 = 405$ . Derivaatan  $u'(R)$  merkin vaihtumisen perusteella erotusfunktio  $u(R)$  saavuttaa paikallisen maksimin tällä arvolla. Koska  $u'(R) > 0$  joukossa  $[0, 450]$ ,  $u(R)$  on kasvava arvoa  $R = 450$  pienemmillä vastuksen arvoilla. Vastaavasti  $u'(R)$  on vähenevä suuremmilla arvoilla. Siten erotusfunktio  $u(R)$  saavuttaa suurimman arvonsa, kun  $R = 450\Omega$ . Ilmeisesti suurin arvo on  $u(450) = \frac{2}{3}E$ .

4. Olkoon  $X$  kelvottomien rasioiden lukumäärä otoksessa (100kpl). Tällöin  $X$  on binomijakautunut satunnaismuuttuja parametrein  $n = 100$  ja  $p = 0,025$ . Erä hyväksytään, jos  $X \leq 1$ . Hyväksymistodennäköisyys on

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1)$$

$$= (1 - p)^n + np(1 - p)^{n-1} = 0,28 = 28\%.$$

5. Käyrien  $x = y^{\frac{1}{2}} + 1$  ja  $x = \frac{-1}{3} + \frac{13}{3}$  leikkauspisteeksi tulee  $(3, 4)$ . Säiliön tilavuus on

$$V = \pi \int_0^4 (y^{\frac{1}{2}} + 1)^2 dy + \pi \int_4^8 (-\frac{1}{3}y + \frac{13}{3})^2 dy$$

$$= \pi/0^4 \frac{1}{2}y^2 + \frac{4}{3}y^{\frac{3}{2}} + y + \frac{\pi}{9/4} - \frac{1}{3}(-y + 13)^3$$

$$= 22\frac{2}{3}\pi + 22\frac{10}{27}\pi = 45\frac{1}{27}\pi \approx 141,5m^2.$$

Koska  $65 < \frac{2}{3}\pi$ , on löydettävä korkeus  $h$ , jolle on

$$V(h) = \pi \int_0^h (y^{\frac{1}{2}} + 1)^2 dy = \pi(\frac{1}{2}h^2 + \frac{4}{3}h^{\frac{3}{2}} + h) = 65.$$

Esimerkiksi haarukointimenetelmällä  $h \approx 3,8m$ .

6. Bakteereja tappajasolujen istuttamisen hetkellä eli välittömästi bakteerien  $n$ :nnen jakaantumisen jälkeen oli  $2^n$  kpl. Olkoon  $k = 0$  hetki, jolloin bakteerien  $n$ :s jakaantuminen tapahtuu, ja olkoon  $x_k$  bakteerien (vast.  $y_k$  tappajasolujen) lukumäärä hetkellä  $k = 0, 1, 2, \dots$  (juuri syömisen ja jakaantumisen jälkeen). Siten

$$x_0 = 2^n$$

$$y_0 = 1024 = 2^{10}$$

$$y_k = 2^k y_0 = 2^{k+10}.$$

Bakteerien lukumäärälle yleisesti pätee

$$x_{k+1} = 2(x_k - y_k) = 2x_k - 2^{k+1}y_0,$$

joten

$$x_0 = 2^n$$

$$x_1 = 2^{n+1} - 2y_0$$

$$x_2 = 2^{n+2} - 2^2y_0 - 2^2y_0 = 2^{n+2} - 2 \cdot 2^2y_0$$

$$x_3 = 2^{n+3} - 2 \cdot 2^3y_0 - 2^3y_0 = 2^{n+3} - 3 \cdot 2^3y_0$$

...

ja edelleen yleisesti

$$x_k = 2^{n+k} - k \cdot 2^k y_0 = (2^n - ky_0)2^k.$$

Jos  $x_0 \leq y_0$  (eli kun  $n \leq 10$ ), kaikki bakteerit syödään hetkellä  $k = 1$ . Muutoin bakteerit tulevat syödyksi loppuun kun  $x_k = 0$  eli kun

$$2^n - ky_0 = 0.$$

Tästä  $k = \frac{2^n}{y_0} = 2^n - 10$