



Solmun tehtävien ratkaisuja

Matti Lehtinen

Esitetään Solmun 1/2002 tehtävien 1–15 ratkaisut. Niitä on toimittajan lisäksi rustaillut *Janne Mansikkamäki* Vammalasta ja *Pekka Aarnio* Harjavallasta. Loput ratkaisut julkaistaan seuraavassa Solmussa.

1. Luku $(\sqrt{50} + 7)^{2001}$ kehitetään desimaaliluvuksi. Määritä luvun 1. ja 2001. desimaali.

Ratkaisu. (Pekka Aarnio) Tunnetusti

$$(a+b)^{2n+1} = a^{2n+1} + \binom{2n+1}{1} a^{2n} b + \binom{2n+1}{2} a^{2n-1} b^2 + \dots + \binom{2n+1}{2n+1} b^{2n+1}$$

ja

$$(a-b)^{2n+1} = a^{2n+1} - \binom{2n+1}{1} a^{2n} b + \binom{2n+1}{2} a^{2n-1} b^2 - \dots - \binom{2n+1}{2n+1} b^{2n+1}.$$

Siten lausekkeissa $(\sqrt{50} + 7)^{2n+1}$ ja $(\sqrt{50} - 7)^{2n+1}$ on samat desimaaliosat, koska desimaaliosaa kertyy vain luvun $a = \sqrt{50}$ parittomista potensseista ja niillä on samat kertoimet ja etumerkit molemmissa lausekkeissa. Koska $\sqrt{50} - 7 = 0,071\dots < 10^{-1}$, niin lausekkeessa $(\sqrt{50} - 7)^{2001}$ on ainakin 2001 nollaa desimaaliosan alussa. Siten myös luvun $(\sqrt{50} + 7)^{2001}$ desimaaliosassa on ainakin 2001 nollaa desimaalipilkun jälkeen. Kysytyt ensimmäinen ja 2001. desimaali ovat siis nollia kumpikin.

2. Kolmion sivujen pituudet ovat peräkkäisiä kokonaislukuja. Yksi kolmion keskijanoista on kohtisuorassa erästä kolmion kulmanpuolittajaa vastaan. Määritä kolmion sivujen pituudet.

Ratkaisu. Olkoot kolmion ABC sivujen pituudet a , b ja c . Voimme olettaa, että mediaani AD ja kulman puolittaja BE leikkaavat toisensa kohtisuorasti pisteessä P . Kolmiossa BDA on silloin BP sekä kulman puolittaja että korkeusjana. Kolmio BDP on tasakylkinen. Mutta silloin $a = 2c$. Koska $\{a, b, c\}$ on kolmen peräkkäisen kokonaisluvun joukko, $a - c$ on 1 tai 2. Jos $a - c = 1$, $c = 1$, $a = 2$, jolloin $b = 3$. Tällöin ABC ei ole kolmio. On siis oltava $a - c = 2c - c = 2$, $c = 2$, $a = 4$, $b = 3$.

3. Kuutio K on leikattu 99:ksi pienemmäksi kuutioksi. Näistä vain yhdellä särmän pituus ei ole 1. Määritä kuution K tilavuus.

Ratkaisu. Jos alkuperäisen kuution särmä on x ja $y \neq 1$ on osakuution särmä, niin $x:n$ ja $y:n$ on oltava muiden keskenään samankokoisten osakuutioiden särmän monikertoja eli x ja y ovat positiivisia kokonaislukuja. Lisäksi on oltava $x^3 - y^3 = 98$ eli $(x-y)(x^2 + xy + y^2) = 98 = 2 \cdot 7^2$. Koska $x - y < x^2 + xy + y^2$, on oltava joko $x - y = 1$ ja $x^2 + xy + y^2 = 98$, $x - y = 2$ ja $x^2 + xy + y^2 = 49$ tai $x - y = 7$, $x^2 + xy + y^2 = 14$. Ensimmäinen vaihtoehto johtaa yhtälöön $(y+1)^2 + y(y+1) + y^3 = 98$ eli $3(y^2 + y) = 97$. Koska 97 ei ole jaollinen 3:lla, tämä ei käy. Kolmas vaihtoehto puolestaan johtaa yhtälöön $(y+7)^2 + y(y+7) + y^2 = 14$, mikä selvästikin on mahdotonta ($14 < 7^2$). Keskimäinen vaihtoehto vuorostaan

johtaa yhtälöön $y^2 + 4y + 4 + y^2 + 2y + y^2 = 3y^2 + 6y + 4 = 49$ eli $y^2 + 2y - 15 = 0$. Tämän yhtälön ainoa positiivinen ratkaisu on $y = 3$. $x = 5$ ja $y = 3$ toteuttavat alkuperäisen yhtälön. Siis $x = 5$, ja K :n tilavuus on 125 yksikköä.

4. Määritä suurin kokonaisluku d , joka on kaikkien lukujen $n(n+1)(2n+2002)$, missä n on positiivinen kokonaisluku, tekijä.

Ratkaisu. Luvuista n ja $n+1$ toinen on parillinen. Jos $n \equiv 2 \pmod{3}$, niin $n+1$ on jaollinen 3:lla ja jos $n \equiv 1 \pmod{3}$, niin $2n+2002 \equiv 2004 \equiv 0 \pmod{3}$. $n(n+1)(2n+2002)$ on siis aina jaollinen 12:lla. Tästä seuraa, että $d = 12k$, missä k on kokonaisluku. Jos $12k$ on tekijänä luvuissa $n(n+1)(2n+2002)$ ja $(n+1)(n+2)(2n+2004)$, se on tekijänä näiden lukujen erotuksessa, joka on $6(n+1)(n+668)$. $2k$ on siis tekijänä luvussa $(n+1)(n+668)$ kaikilla n erityisesti $2k$ on tekijänä luvuissa $(2k+1)(2k+668)$ ja $(2k+2)(2k+669)$. Koska $2k$:lla ja $2k+1$:llä ei ole yhteisiä tekijä, se on $2k+668$:n tekijä. Mutta $2k+668$:lla ja $2k+669$:llä ei ole yhteisiä tekijöitä, joten $2k$ on $2k+2$:n tekijä. Silloin $2k$ on luvun 2 tekijä, joten $k = 1$. Siis $d = 12$.

5. Montako alkiota on suurimmassa joukon $A = \{1, 2, \dots, 547\}$ sellaisessa osajoukossa, jossa minkään kahden luvun summa ei ole jaollinen 42:lla?

Ratkaisu. Olkoon A_i niiden A :n lukujen joukko, jotka ovat kongruenteja i :n kanssa modulo 42. Koska $547 = 13 \cdot 42 + 1$, niin A_1 :ssä on 14 alkiota ja muissa joukoissa A_i on 13 alkiota. Jos A :n osajoukossa minkään kahden luvun summa ei ole jaollinen 42:lla, joukossa ei ole kahta lukua, joista toinen kuuluisi joukkoon A_i ja toinen joukkoon A_{42-i} . Joukossa ei myöskään ole kahta lukua, jotka molemmat kuuluisivat joukkoon A_0 tai A_{21} . Maksimaalisessa ehdot täyttävässä osajoukossa voi siis olla joukot A_1, A_2, \dots, A_{20} ja yksi luku joukosta A_0 ja yksi luku joukosta A_{21} . Maksimaalinen alkionäärä on $14 + 19 \cdot 13 + 2 = 263$.

6. Ympyrät, joiden säteet ovat h ja k , sivuavat suoraa ℓ pisteissä A ja B . Ympyrät leikkaavat toisensa pisteissä C ja D . Todista, että kolmioiden ABC ja ABD ympäri piirrettyjen ympyröiden säteet ovat samat. Määritä tämä säde.

Ratkaisu. Ratkaisu perustuu sinilauseen toistuvaan käyttöön. Voimme olettaa, että D on kolmion ABC sisäpiste. Kehäkulmalauseen perusteella $\angle CAB = 180^\circ - \angle ADC$ ja $\angle ABC = 180^\circ - \angle CDB$. Olkoon R_C kolmion ABC ympäri piirretyn ympyrän säde. Sinilauseen nojalla kolmioista ADC ja ABC saadaan $AC = 2h \sin(\angle ADC) = 2h \sin(\angle CAB)$ ja $AC = 2R_C \sin(\angle ABC)$. Vastaavasti kolmioista CDB ja ABC saadaan $BC = 2k \sin(\angle CDB) = 2k \sin(\angle ABC)$ ja $BC = 2R_C \sin(\angle CAB)$. Kun yhtälöt $2h \sin(\angle CAB) = 2R_C \sin(\angle ABC)$ ja $2k \sin(\angle ABC) = 2R_C \sin(\angle CAB)$ kerrotaan keskenään, saadaan $R_C^2 = hk$. Olkoon R_D

kolmion ABD ympäri piirretyn ympyrän säde. Nyt $\angle DAB = \angle DCA$ ja $\angle ABD = \angle BCD$. Kolmioista ADC ja ABD saadaan $AD = 2h \sin(\angle DCA) = 2h \sin(\angle DAC) = 2R_D \sin(\angle ABD)$, kolmioista DBC ja ABD puolestaan $DB = 2k \sin(\angle BCD) = 2k \sin(\angle ABD) = 2R_D \sin(\angle DAB)$. Kun yhtälöt kerrotaan keskenään, saadaan $R_D^2 = hk$. Säteet R_C ja R_D ovat samat ja $= \sqrt{hk}$.

7. Olkoon positiivisten lukujen a_1, a_2, \dots, a_n tulo 1. Osoita, että

$$\sqrt{a_1} + \sqrt{a_2} + \dots + \sqrt{a_n} \leq a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

Ratkaisu. Aritmeettis-geometrisen epäyhtälön nojalla

$$1 = (\sqrt{a_1} \sqrt{a_2} \dots \sqrt{a_n})^{1/n} \leq \frac{\sqrt{a_1} + \sqrt{a_2} + \dots + \sqrt{a_n}}{n}.$$

Cauchy-Schwarzin epäyhtälön nojalla

$$(\sqrt{a_1} + \sqrt{a_2} + \dots + \sqrt{a_n})^2 \leq n(a_1 + a_2 + \dots + a_n) \leq (\sqrt{a_1} + \sqrt{a_2} + \dots + \sqrt{a_n})(a_1 + a_2 + \dots + a_n).$$

Väite saadaan tästä jakolaskulla.

8. Seurueen jokaisen neljän jäsenen joukossa on yksi, joka on tuttu kyseisten kolmen muun jäsenen kanssa. Todista, että seurueessa on ainakin yksi jäsen, joka on tuttu seurueen kaikkien muiden jäsenten kanssa.

Ratkaisu. Oletetaan, että seurueessa kukaan ei tunne kaikkia muita. Olkoon A eräs seurueen jäsen. Seurueessa on silloin ainakin yksi jäsen B , joka ei ole tuttu A :lle. Olkoot C ja D kaksi muuta seurueen jäsentä. Joukossa $\{A, B, C, D\}$ on ainakin yksi, joka tuntee muut kolme. Tämä yksi ei ole A eikä B , joten se on C tai D . Joka tapauksessa C ja D tuntevat toisensa. Koska C ja D ovat mielivaltaisia, tiedetään, että jos A ja B poistetaan seurueesta, kaikki muuta jäsenet tuntevat toisensa. Mutta joko C tai D tunsivat sekä A :n että B :n ja niin muodoin kaikki seurueen jäsenet. Ristiriita, joka osoittaa alkuperäisen oletuksen virheelliseksi.

9. Varastossa on 2001 juustonpalaa. Todista, että on mahdollista leikata yksi paloista kahteen osaan niin, että palat voidaan kerätä kahteen säkkiin, joiden sisältö painaa yhtä paljon ja joissa on kummassakin yhtä monta palaa.

Ratkaisu 1. Olkoot juustonpalojen painot $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_{2001}$. Valitaan palat $a_1, a_3, \dots, a_{1999}$ toiseen säkkiin ja palat $a_2, a_4, \dots, a_{2000}$ toiseen. Säckien painon erotus on

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{1000} (a_{2k} - a_{2k-1}) &= a_{2000} - \sum_{k=1}^{999} (a_{2k+1} - a_{2k}) - a_1 \\ &\leq a_{2000} - a_1 < a_{2000} \leq a_{2001}. \end{aligned}$$

Mutta näin ollen pala a_{2001} voidaan leikata kahdeksi palaksi, joiden painojen erotus on sama kuin säkkiä painojen erotus. Kun raskaampi pala pannaan kevyempään säkkiin ja kevyempi raskaaseen, molemmat säkit tulevat yhtä painaviksi.

Ratkaisu 2. (Janne Mansikkamäki) Todistetaan induktiolla, että $2n - 1$ juustonpalaa voidaan aina säkittää vaaditulla tavalla.

1°. Kun $n = 1$, paloja on yksi, ja se voidaan jakaa kahdeksi yhtä suureksi palaksi.

2°. Oletetaan, että kun $n = k$, jako voidaan tehdä. Olkoon sitten $n = k + 1$. Jaetaan ensin $2k - 1$ palaa tehtävän mukaisesti kahteen säkkiin. Tällöin on yksi paloista jaettu kahdeksi osaksi. Olkoon sen paino x_1 . Kun tämän palan osat poistetaan säkeistä, niissä on yhä yhtä monta palaa. Säkit painavat s_1 ja s_2 . Oletetaan, että $s_1 \leq s_2$. Huomataan, että $s_2 - s_1 < x_1$. Nyt säkkeihin on laittamatta kolme palaa. Niiden painot ovat x_1, x_2 ja x_3 . Voidaan olettaa, että $x_1 \leq x_2 \leq x_3$. Jaetaan nyt suurin pala osiksi, joiden painot ovat d ja $x_3 - d$. Osoitetaan, että d voidaan valita niin, että

$$s_1 + x_2 + d = s_2 + x_1 + (x_3 - d)$$

eli

$$d = \frac{(s_2 - s_1) - (x_2 - x_1) + x_3}{2}.$$

Koska $s_2 - s_1 \leq x_1$ ja $x_2 - x_1 \leq x_2$, niin $|(s_2 - s_1) - (x_2 - x_1)| < x_2 \leq x_3$, joten todellakin $d < x_3$. Induktioaskel voidaan siis ottaa.

10. Kokonaislukukertoimisella n :nnen asteen ($n \geq 5$) polynomilla $P(x)$ on n eri kokonaislukunollakohtaa $0, x_2, x_3, \dots, x_n$. Määritä polynomien $P(P(x))$ kokonaislukunollakohdat.

Ratkaisu. Tehtävän mukaan $P(x) = a_n x(x - x_2)(x - x_3) \cdots (x - x_n)$, missä a_n on kokonaisluku. Osoitetaan, että $P(k) \neq x_i$ kaikilla $i \geq 2$ ja kaikilla kokonaisluvulla k . Vastaoletukseksi voidaan asettaa $P(k) = x_2$ jollain kokonaisluvulla k . Silloin k on x_2 :n tekijä, eli $x_2 = kt$ jollain kokonaisluvulla t . Edelleen silloin $a_n k(1 - t)(k - x_3) \cdots (k - x_n) = t$, joten $1 - t$ on t :n tekijä. Silloin joko $t = 0$ tai $t = 2$. Jos $t = 0$, $x_2 = 0$, mikä ei ole tehtävän ehtojen mukaan mahdollista. Siis $t = 2$ ja $a_n k(k - x_3)(k - x_4) \cdots (k - x_n) = -2$. Luvut $k, k - x_3, k - x_4, \dots, k - x_n$ ovat kaikki eri lukuja ja luvun -2 tekijöitä. Koska viimeinen ehto toteutuu vain, kun luvut kuuluvat joukkoon $\{-2, -1, 1, 2\}$, on oltava $n = 5$ ja $|a_n k(k - x_3)(k - x_4)(k - x_5)| \geq 4$. Ristiriita. Siis $P(x) \neq x_i$, joten $P(P(x)) = 0$ vain, kun $P(x) = 0$ eli x on jokin P :n nollakohdista $0, x_i$.

11. Veljekset möivät n lammasta hintaan n euroa/lamma. Rahat jaettiin niin, että vanhempi veli otti ensin 10 euroa, sitten nuorempi otti 10 euroa jne., kunnes oli nuoremman veljen vuoro ottaa rahaa, jota ei

kuitenkaan enää ollut kymmentä euroa. Tällöin sovittiin, että nuorempi veli saa loput rahat sekä vanhemman linkkuveitsen, ja jako menee tasan. Minkä arvoisen oli linkkuveitsi?

Ratkaisu. Veljekset saivat n^2 dollaria. Olkoon $n = 10a + b$. Silloin $n^2 = 100a^2 + 20ab + b^2$. Kertomuksen mukaan $n^2 = (2k + 1) \cdot 10 + y$. Luvun b^2 on oltava muotoa $(2m + 1) \cdot 10 + y$. Mutta kymmentä pienempien lukujen neliöistä tätä muotoa ovat vain 16 ja 36. Koska viimeisessä jakovaiheessa vanhempi veli sai 10 dollaria ja nuorempi siis 6, täytyy linkkuveitsen arvon olla 2 dollaria.

12. Reaaliluvut a ja b toteuttavat yhtälöt

$$a^3 - 3ab^2 = 20, \quad b^3 - 3a^2b = 40.$$

Määritä $a^2 + b^2$.

Ratkaisu.

$$\begin{aligned} 2000 &= 400 + 1600 = 20^2 + 40^2 \\ &= (a^3 - 3ab^2)^2 + (b^3 - 3a^2b)^2 \\ &= a^6 - 6a^4b^2 + 9a^2b^4 + b^6 - 6a^2b^4 + 9a^4b^2 \\ &= a^6 + 3a^4b^2 + 3a^2b^4 + b^6 = (a^2 + b^2)^3. \end{aligned}$$

Siis $a^2 + b^2 = \sqrt[3]{2000}$.

13. Olkoon

$$a_n = \left\lfloor \frac{n}{1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n}{n} \right\rfloor.$$

Osoita, että $a_n = 2 + a_{n-1}$ silloin ja vain silloin, kun n on alkuluku.

Ratkaisu. Kirjoitetaan yhtälö $a_n = 2 + a_{n-1}$ muotoon

$$\begin{aligned} &\left\lfloor \frac{n}{1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n}{n} \right\rfloor \\ &= 2 + \left\lfloor \frac{n-1}{1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n-1}{n-1} \right\rfloor \end{aligned}$$

eli

$$\begin{aligned} &\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n}{n-1} \right\rfloor \\ (1) \quad &= \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n-1}{3} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n-1}{n-1} \right\rfloor. \end{aligned}$$

Selvästi kaikilla $k, 2 \leq k \leq n-1$ on $\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor \geq \left\lfloor \frac{n-1}{k} \right\rfloor$, joten

$$\begin{aligned} &\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n}{n-1} \right\rfloor \\ (2) \quad &\geq \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n-1}{3} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n-1}{n-1} \right\rfloor. \end{aligned}$$

Jos $n = ab, 2 \leq a < n$, niin $\left\lfloor \frac{n}{a} \right\rfloor = b > \left\lfloor \frac{n-1}{a} \right\rfloor$. Tällöin (2):ssa on aito erisuuruus, joten (1) ei toteudu.

Mutta jos n on alkuluku, on kaikilla k $n = qk + r$, missä $1 \leq r < k$. Silloin kaikilla k on $\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor = q = \left\lfloor \frac{n-1}{k} \right\rfloor$, ja (1) toteutuu.

14. Todista, että kaikilla luonnollisilla luvuilla n luku $2^n + n^2$ on jaollinen 5:llä silloin ja vain silloin, kuin luku $n^2 \cdot 2^n + 1$ on jaollinen 5:llä.

Ratkaisu. Jos $n = 5k$, niin kumpikaan luvuista $2^n + n^2$ ja $n^2 \cdot 2^n + 1$ ei ole jaollinen 5:llä. Jos $n = 5k \pm 1$, niin $(n-1)(n+1) = n^2 - 1$ on jaollinen 5:llä. Koska $n^2 2^n + 1 = (2^n - 1)(n^2 - 1) + 2^n + n^2$, ja $n^2 2^n + 1$ ja $2^n + n^2$ ovat samanaikaisesti 5:llä jaollisia. Jos $n = 5k \pm 2$, $n^2 + 1 = 25k^2 \pm 20k + 4 + 1$, joten $n^2 + 1$ on jaollinen 5:llä. Mutta $n^2 2^n + 1 = (2^n + 1)(n^2 + 1) - 2^n - n^2$, ja $n^2 2^n + 1$ ja $2^n + n^2$ ovat jälleen samanaikaisesti 5:llä jaollisia.

15. Määritä kaikki alkuluvut n , joiden kymmenjärjestelmäesitys on $n = 10101 \dots 01$.

Ratkaisu. Tehtävän luvut ovat muotoa

$$a_n = \sum_{k=0}^{n-1} 10^{2k},$$

missä $n \geq 2$ on luvussa olevien ykkösten määrä. Jos n on parillinen, a_n on jaollinen 101:llä. 101 on itsessään alkuluku. Jos $n = 2p + 1$, niin

$$\begin{aligned} 11a_n &= \sum_{k=0}^{2p} 10^{2k+1} + \sum_{k=0}^{2p} 10^{2k} \\ &= \sum_{k=0}^{4p+1} 10^k = (10^{2p+1} + 1) \sum_{k=0}^{2p} 10^k. \end{aligned}$$

Jos $p \geq 1$, niin oikean puolen molemmat tekijät ovat > 11 , joten a_n ei voi olla alkuluku. Siis 101 on ainoa vaadittua muotoa oleva alkuluku.