

# Pohjoismainen matematiikkakilpailu 2010

## Tehtävien ratkaisuja

**1.** Koska  $f$  on kasvava,  $f(7)f(13) = f(7 \cdot 13) = f(91) \geq f(90) = f(9 \cdot 10) = f(9)f(10)$ . Samoin  $f(8)f(9) = f(8 \cdot 9) = f(72) \geq f(70) = f(7 \cdot 10) = f(7)f(10)$ . Koska  $f$  saa vain positiivisia arvoja, Siis  $f(7)f(13)f(8)f(9) \geq f(9)f(10)f(7)f(10)$ . Kun tämä epäyhtälö jaetaan puolittain luvulla  $f(7)f(9)$ , saadaan väite.

**2. 1. ratkaisu.** Olkoon  $\angle AOV = \alpha$ ,  $\angle AOW = \beta$  ja  $\angle ZOB = \gamma$ .  $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$ . Lisäksi  $\angle BOX = \alpha$  (ristikulmat) ja  $\angle ACY = \alpha = \angle BCX$  (kehäkulmat);  $\angle COX = \beta$  (ristikulmat),  $\angle ABZ = \beta = \angle CBX$  (kehäkulmat);  $\angle COY = \gamma$  (ristikulmat);  $\angle BAZ = \gamma = \angle CAY$ . Jokaisessa kolmioista  $CYA$ ,  $CBX$  ja  $ZBA$  on nyt kaksi kulmaa joukosta  $\{\alpha, \beta, \gamma\}$ . Silloin kolmannenkin on oltava kyseisen joukon kolmas kulma. Kolmiot ovat siis yhdenmuotoiset. Yhdenmuotoisuudesta seuraa


$$\frac{AY}{CY} = \frac{AB}{BZ}, \quad \frac{CX}{BX} = \frac{AZ}{AB}.$$

Siis

$$\frac{AY}{AZ} \cdot \frac{BZ}{BX} \cdot \frac{CX}{CY} = \frac{AB}{BZ} \cdot \frac{AZ}{AB} \cdot \frac{BZ}{AZ} = 1.$$

**2. ratkaisu.** Olkoot kulmat  $\alpha$ ,  $\beta$  ja  $\gamma$  niin kuin ensimmäisessä ratkaisussa ja olkoot ympyröiden  $\Gamma_A$ ,  $\Gamma_B$  ja  $\Gamma_C$  säteet  $R_A$ ,  $R_B$  ja  $R_C$ . Laajennetun sinilauseen perusteella  $AY = 2R_B \sin \alpha$ ,  $BZ = 2R_C \sin \gamma$ ,  $CX = 2R_A \sin \beta$ ,  $AZ = 2R_C \sin \beta$ ,  $BX = 2R_A \sin \alpha$  ja  $CY = 2R_B \sin \gamma$ . Kun nämä sijoitetaan tehtävän lausekkeeseen, nähdään heti, että lausekkeen arvo on 1.

**3.** Jos Risto valitsee kaksi lamppua, jotka hän joka kerta sytyttää, hän voi käydä läpi kaikki muiden lampujen kytkinten  $2^{2008}$  asentoa ilman, että Laura saa tietää kahden lampun tilanteesta. Sen jälkeen hän voi jättää molemmat lamput sammuksiin ja taas käydä läpi muiden lampujen  $2^{2008}$  eri asentoa. Tämän jälkeen Riston on valittava jokin sellainen yhdistelmä, jossa vain toinen valituista lampuista palaa, ja nyt Laura saa tietää näiden lampujen tilan. Mutta läpikäydyissä tapauksissa on esiintynyt jokaisen muun lampun kohdalla tilanne, jossa vain se on sytytettynä; näin Laura on saanut tietää kaikkien lampujen ja kytkinten yhteyden kaikkiaan  $2^{2009} + 1$ :n sytytyskerran aikana. Toisaalta Risto voi salata jonkin lampun ja kytkimen yhteyden vain, jos lamppu käyttäätyy kaikissa painallusyhdistelmissä samoin kuin jokin toinen lamppu. Erilaisia painallusyhdistelmiä, joissa kaksi lamppua käyttäätyy samoin, on  $2 \cdot 2^{2008}$ . Näin ollen  $2^{2009} + 1$ :n painallusyhdistelmän jälkeen Laura tietää kaikki yhteydet.



Jos Laura saa valita kytkimet, hän jakaa ne ensin kahteen yhtä suureen luokkaan  $A_1$  ja  $A_2$  ja painaa luokkaan  $A_1$  kuuluvia kytkimiä. Nyt hän jakaa  $A_1$ :n ja  $A_2$ :n (lähes) yhtä suuriin luokkiin  $A_{11}$ ,  $A_{12}$ ;  $A_{21}$ ,  $A_{22}$  ja painaa luokkiin  $A_{11}$  ja  $A_{21}$  kuuluvia kytkimiä. Nyt hän on saanut tietää kuhunkin luokan kytkimiin kuuluvat syttyvät lamput. Laura jatkaa samalla tavalla ja saa selville aina pienemmistä kytkinjoukoista niihin kuuluvat syttyvät lamput. Koska  $2^{11} = 2048 > 2010$ , yhdennentoista jaon luokat ovat enintään yhden kytkimen muodostamia; nyt Laura tietää jokaiseen kytkimeen kuuluvat lamput. Siten Laura selviää 11 valinnalla. – Kymmenen valintaa ei riitä, koska kahden lampun erottaminen toisistaan on mahdollista vain, jos niihin liittyvät kytkimet ovat jossain painelussa eri joukoissa, toinen ”painetuissa”, toinen ”ei painetuissa”.  $2^k$ :n painelun jälkeen suurimmassa sellaisessa joukossa, jonka kytkimet ovat joka painalluksessa olleet samassa tilassa (painettuina tai ei-painettuina), on ainakin  $\lceil 2010/2^k \rceil$  alkiota; kun  $k = 10$ , tämä luku on 2.

**4.** Jos  $m = \sum_{k=0}^n t_k 10^k$ ,  $0 \leq t_k \leq 9$ , on mielivaltainen positiivinen kokonaisluku, niin voidaan valita yksinkertaiset luvut  $s_1, s_2, \dots, s_9$  niin, että  $s_p = \sum_{k=0}^n e_k 10^k$  ja  $e_k = 1$ , kun  $p \leq t_k$  ja  $e_k = 0$ , kun  $p > t_k$ . Summassa  $s = s_1 + s_2 + \dots + s_9$  jokaisen 10 potenssin kerroin on  $t_k$ , joten  $s = m$ . Vaadittu esitys syntyy siis aina ainakin 9:llä yksinkertaisella luvulla.

Osoitetaan sitten, että on olemassa lukuja, joita ei voi esittää vähemmällä kuin yhdeksällä yksinkertaisella luvulla. Olkoon esimerkiksi

$$m = 10203040506070809 = \sum_{k=1}^9 k 10^{18-2k}.$$

Oletetaan, että  $m = s_1 + s_2 + \dots + s_j - s_{j+1} - \dots - s_n = b_1 - b_2$ , missä  $n < 9$ , jokainen  $s_i$  on yksinkertainen,  $b_1$  positiivisten ja  $b_2$  negatiivisten termien summa. Luvun  $b_1$  kaikki numerot ovat  $\leq j$  ja luvun  $b_2$  kaikki numerot ovat  $\leq n - j$ . Nyt  $b_1 = m + b_2$ . Ajatellaan viimeinen yhteenlasku suoritettavaksi tavallisena allekkain yhteenlaskuna ja katsotaan sitä saraketta, jossa on luvun  $m$  numero  $j + 1$ . Sen alapuolella on luvun  $b_2$  numero  $x$ . Koska  $n \leq 8$ , näiden numeroiden oikealla puolella on luku, joka on pienempi kuin

$$10^{15-2j} + 8 \sum_{k=0}^{15-2j} 10^k < 9 \sum_{k=0}^{15-2j} 10^k.$$

Muistinumeroa ei siis tule, ja  $j + 1 + x \geq 10$ . Siis  $x \geq 9 - j$ . Koska  $x \leq n - j$ , on  $n \geq 9$ , mikä on ristiriidassa oletuksen  $n < 9$  kanssa. Siis oletus  $n < 9$  on hylättävä, ja on tullut todistetuksi, että kaikkia lukuja ei voida esittää alle yhdeksän yksinkertaisen luvun avulla.